

OCUflash® blue

kapi za oko, otopina, bez konzervansa

1. Što je OCUflash blue i za što se koristi

OCUflash blue je izotonična, puferska otopina za oko bez konzervansa, koja kao dodatak sadrži ekstrakt biljke vidac (*Euphrasia officinalis*). Namijenjena je za ukapavanje u oko ili za ispiranje oka.

Ekstrakt biljke vidac (*Euphrasia officinalis*) djeluje kao antiflogistik i adstringent. Ova svojstva biljke vidac već dugo se koriste za smirivanje nadraženog (iritiranog) oka te za prevenciju i dodatno liječenje neinfektivnih upala očnih kapaka i konjunktive oka.

OCUflash blue je najbolji koliraj za uklanjanje stranih tijela iz oka te u slučaju neugoda u oku kao što su peckanje, grebanje, svrbež i osjećaj stranog tijela u oku.

OCUflash blue ne sadrži konzervanse, pa je idealan preparat za nositelje kontaktnih leća kao i za ljude sa osjetljivim očima.

U praksi, OCUflash blue se može koristiti u slijedećim slučajevima:

- ispiranje oka nakon tonometrije i goniokopije,
- ispiranje oka zbog uklanjanja stranog tijela, prašine i klorirane vode,
- ispiranje ostatka otopine fluoresceina,
- ispiranje mukoznih i supurativnih sekreta,
- ispiranje oka nakon stavljanja tvrdih kontaktnih leća,
- kao prva pomoć kod blagih erozija konjunktive i oka izazvanih kiselinama i lužinama (kreč, žbuka, mort),
- kao dopunsко liječenje neinfektivnih upala i kroničnih infekcija konjunktive,
- kao prikladna otopina za uklanjanje kozmetičkih preparata s predjela oka (kapci, trepavice)

OCUflash blue mogu koristiti odrasli i djeca. Zbog sigurnosti preparata, može se koristiti i u novorođenčadi, dojenčadi, trudnica i dojilja.

2. Što treba znati prije korištenja OCUflash blue

OCUflash blue se ne smije koristiti kod preosjetljivosti na bilo koji sastojak ovog preparata. U slučaju da koristite još neke kapi ili mast za oči, preporučuje se razmak između primjene od najmanje 5 minuta.

3. Kako se koristi OCUflash blue

Za smirivanje nadraženog oka i za dodatno liječenje neinfektivnih upala konjunktive i kapaka, 1-2 kapi, 1-4 puta dnevno ukapati u konjunktivalnu vrećicu oka. Za ispiranje stranog tijela iz oka aplicirajte otopinu sve dok strano tijelo nije uklonjeno te do olakšanja tegoba.

OCUflash blue se može koristiti duže vremensko razdoblje.

Korisnici kontaktnih leća

OCUflash blue je pogodan za korisnike kontaktnih leća.

Upozorenje prije prve upotrebe

Nakon otvaranja boćice i prije prve primjene u oko, preporučuje se laganim pritiskom boćice kapnuti jednu probnu kap. Jakim i nepravilnim pritiskanjem boćice izaći će prevelika količina otopine.

Nakon kapanja pustite zrak da se usisa nazad u plastičnu bočicu kako bi bila spremna za sljedeću kap i kako bi boćica povratila svoj originalni oblik, te potom možete nastaviti s ukapavanjem kako je preporučeno.

1. Izvadite plastičnu bočicu s OSD čepom iz kartonske kutijice.



2. Prije prve upotrebe uklonite zaštitnu traku s OSD čepa.





3. Uklonite poklopac s OSD kapaljke.



4. Nagnite glavu unazad. Držite plastičnu bočicu okrenutu prema dolje između palca i ostalih prstiju. Blagim pritiskom bočice uka-pajte propisani broj kapi u oko, te zatim polagano zatvorite oko kako bi OCUflash blue ravnomjerno obložio površinu oka.

Tijekom primjene vrh kapaljke ne smije dodirivati niti oko niti očne kapke. Nakon primjene treba čvrsto zavrnuti zaštitni poklopac (čep) kako bi se izbjegla kontaminacija.

4. Koje su moguće nuspojave

Vrlo rijetko, odmah nakon ukapavanja, može se javiti prolazan osjećaj peckanja. Također, mogu se javiti alergijske reakcije. U slučaju pojave nuspojava ili drugih neuobičajenih reakcija obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

5. Što OCUflash blue sadrži

1 ml otopine sadrži 7 mg natrijevog klorida, dinatrijev edetat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, polisorbat 80, ekstrakt biljke vidac (*Euphrasia officinalis*), natrijev tetraborat, natrijev hidroksid, vodu za injekcije.

6. Kako čuvati OCUflash blue i druge informacije

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne čuvati u hladnjaku/ne zamrzavati.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Preparat ne koristiti nakon isteka roka trajanja istaknutog na naljepnici bočice ili na kartonskoj ambalaži. Datum roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Ne koristiti OCUflash blue po isteku 3 mjeseca od prvoga otvaranja bočice.

Pakiranje: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Republika Slovačka
Tel: +421 2 4333 3786
Fax: +421 2 4363 8743
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

CE 2265

Datum izrade upute 10.2014.