

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

OCUhyl C

Nátrium-hialuronát 1,2 mg/ml

Oldatos szemcsepp

1. Mi az OCUhyl C és mire használható?

Az **OCUhyl C** nedvesítő, nyugtató és síkosítást elősegítő, steril szemcsepp, különösen érzékeny szemre. A hialuronsavnak köszönhetően (amely a szemben és a test más részeiben is természetes módon jelen van) ez a szemcsepp hatékonyan biztosítja a szem nyugalmát, és a száraz, égető érzésre, valamint a fáradtságra hosszantartó komfortérzettel regál. Az **OCUhyl C** szemcsepp körömvirág-kivonatot is tartalmaz, amely védelmet nyújt az irritációval szemben és regeneráló hatást fejt ki a szaruhártya felső hámrétegére. Az **OCUhyl C** nem tartalmaz semmilyen tartósítószerrel vagy antimikrobiális adalékot, ezért azok is használhatják, akiknek érzékeny a szemük vagy kontaktlencsét hordanak. Az szemcseppet felnőttek, fiatalok és gyerekek egyaránt használhatják.

Az **OCUhyl C** külsőleg használatos szemcsepp. Csökkent könnyképződés, szárazságérzet, idegen test érzet, fáradtság- vagy égető érzés kiegészítő kezelésére alkalmas. A szaruhártya és a kötőhártya védelmét ellátó könnyfilm erősítésére is alkalmas. Az **OCUhyl C** kontaktlencsével is használható.

2. Mit kell tudni az OCUhyl C használata előtt?

A készítmény valamelyik hatóanyagára vagy segédanyagára való túlérzékenység esetén az **OCUhyl C** -t nem szabad használni.

Amennyiben egyéb szemészeti készítményt is alkalmaznia kell egyidejűleg, az **OCUhyl C** legyen az utolsó, és legkevesebb 5 perc teljék el az előző készítmény alkalmazásától számítva. A kezelőorvosát tájékoztatnia kell valamennyi gyógyszerről, amelyet éppen használ, esetleg a közelmúltban használt vagy a jövőben használni készül, akár vényköteles, akár szabadon beszerezhető gyógyszerről van szó. Amennyiben más szemészeti készítményeket is használ, az egyidejű alkalmazás lehetőségét beszélje meg szemorvosával.

3. Hogyan kell alkalmazni az OCUhyl C-t?

Amennyiben az orvos másként nem rendel, általában a kötőhártya-zsákba kell cseppenteni 1 cseppet, naponta 1-3 alkalommal, de többször is alkalmazható. Gyermekeknél az alkalmazást az orvos egyénre szabva írja elő.

A készítményt felnőttek, serdülők és gyermekek egyaránt használhatják.

A készítmény használatának módja:

1. Vegye ki az OSD cseppentőfejjel ellátott flakont a papírdobozból.
2. Az első használat előtt távolítsa el a cseppentőfejről a biztonsági gyűrűt.
3. Vegye le a cseppentőfej védőkupakját.
4. Hajtsa hátra a fejét, fordítsa a műanyag flakont aljával felfelé, a mutatóujjával finoman húzza le az alsó szemhéját, cseppentse be az előírt számú cseppet, majd lassan csukja be szemét, hogy az **OCUhyl C** egyenletesen szétfolyjon az egész szemében.

Használat közben vigyázzon, hogy a cseppentő ne érjen sem a szeméhez, sem a pillájához. A csepegtetés befejeztével szorosan helyezze vissza a flakonra a védőkupakot, hogy megakadályozza a csepegtetőfej végének esetleges szennyeződését.

Mire ügyeljünk használatkor

Első használat előtt javasolt, hogy az első cseppentést próbaképpen ne a szembe végezze, mivel a flakon erős nyomás hatására nagyobb mennyiségű oldatot ereszthet ki.

A következő csepp kinyomásához engedni kell, hogy levegő szívódjék a műanyag flakonba, és az visszanyerje eredeti alakját.

Közvetlenül az alkalmazás után előfordulhat homályos látás, ezért az alkalmazást követő 20 percen belül tartózkodni kell a gépjárművezetéstől, a gépek kezelésétől és a nagy magasságban végzett munkától.

Ha gyermeke véletlenül fogyasztana a készítményből, forduljon orvoshoz.

4. Lehetséges mellékhatások

Ritkán, közvetlenül az alkalmazást követően előfordulhat átmeneti égető érzés. Allergiás reakciót is kiválthat.

Az ilyen mellékhatásokról vagy más szokatlan tünetekről tájékoztassa kezelőorvosát.

5. Az OCUhyl C szemcsepp összetevői

Natrii hyaluronas (nátrium-hialuronát) 1,2 mg/ml

Segédanyagok: calendulae extractum (körömvirág kivonat), natrii chloridum (nátrium-klorid), kalii chloridum (kálium-klorid), calcii chloridum dihydricum (kalcium-klorid-dihidrát), magnesii chloridum hexahydricus (magnézium-klorid-hexahidrát), natrii acetat trihydricus (nátrium acetát trihidrát), natrii citras (nátrium citrát), aqua ad iniectabile (injekcióhoz való víz).

6. Az OCUhyl C tárolására vonatkozó és egyéb tudnivalók

A készítmény legfeljebb 25 °C-on tárolandó, óvja a hidegtől és a fagytól.

A készítményt gyermekektől elzárva tartandó.

A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja.

A felbontott csomagolást 3 hónapon belül használja el.

A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja, ami a csomagoláson található. A lejárati idő a feltüntetett hónap utolsó napjára vonatkozik.

Csomagolás: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Szlovák Köztársaság

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

A használati útmutató legutóbbi ellenőrzésének dátuma:

2016. július



2265 STERILE A